



# ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 · 2024

## ROTINA

### Crianças de 6 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias


VACINA	ESQUEMA PRIMÁRIO	INTERVALO MÍNIMO	1º REFORÇO
 Pfizer Baby (tampa vinho)	6 meses (D1)	4 semanas após D1 e 8 semanas após D2	—
	7 meses (D2)		
	9 meses (D3)		
 Coronavac* (3 a 4 anos)	1ª Dose (D1) e 2ª Dose (D2)	4 semanas após D1	4 meses após D2. Preferencialmente com Pfizer Baby

\*A vacina CoronaVac poderá ser administrada em situações específicas, como: resgate de crianças não vacinadas na idade recomendada, falta do imunizante recomendado ou contraindicações à Pfizer Baby em crianças de 3 e 4 anos de idade.

Fonte: DPNI/SVSA/MS



## GRUPOS PRIORITÁRIOS

### Crianças de 5 a 11 anos 11 meses e 29 dias

VACINA	ESQUEMA PRIMÁRIO	INTERVALO MÍNIMO	REFORÇO
 Pfizer Pediátrica (tampa laranja)	D1	4 semanas após D1	Pfizer pediátrica (tampa laranja) 6 meses entre a última dose e a dose de 2024*
	D2		

Fonte: DPNI/SVSA/MS

### Pessoas acima de 12 anos de idade

VACINA	ESQUEMA PRÉVIO	RECOMENDAÇÃO EM 2024	INTERVALO MÍNIMO
 Pfizer Bivalente (tampa cinza)	Nenhuma dose*	Duas doses	4 semanas entre as doses
 Pfizer Bivalente (tampa cinza)	Se 1 dose	Receber uma dose	4 semanas entre as doses
	Se 2 doses ou mais		6 meses entre a última dose e a dose de 2024**

\*Pessoas imunocomprometidas sem esquema primário possuem orientação de receber três doses da vacina COVID-19 com intervalo de 4 semanas entre a primeira e a segunda dose, e 8 semanas entre a segunda e terceira dose. Uma dose reforço de vacina bivalente poderá ser realizada após 6 meses da última dose deste esquema.


\*\*Para pessoas com 60 anos e mais, imunocomprometidas, gestantes e puérperas, uma nova dose está indicada em 2024 após o intervalo de 6 meses. Para os demais grupos prioritários a recomendação é UMA DOSE ANUAL.

Fonte: DPNI/SVSA/MS

## NÃO PERTENCENTE A GRUPOS PRIORITÁRIOS

Esquemas primários e/ou doses de reforço para pessoas que NÃO pertencem ao grupo prioritário não são mais recomendados. Porém, caso o indivíduo opte por iniciar e/ou concluir o esquema primário deve seguir as seguintes recomendações:

### Crianças de 5 a 11 anos 11 meses e 29 dias


VACINA	ESQUEMA PRIMÁRIO	INTERVALO MÍNIMO	ESQUEMA ENCERRADO
 Pfizer Pediátrica (tampa laranja)	D1	4 semanas após D1	ESQUEMA ENCERRADO
	D2		

Particularidades:

Fonte: DPNI/SVSA/MS

- Se 1 dose antes dos 5 anos: receber 1 dose e encerrar esquema.
- Se 2 doses antes dos 5 anos: encerrar esquema.
- Se 3 doses antes dos 5 anos: considerar esquema completo (NÃO NECESSITA RECEBER NOVAS DOSES)

### Pessoas acima de 12 anos de idade

VACINA	ESQUEMA PRIMÁRIO	INTERVALO MÍNIMO	ESQUEMA ENCERRADO
 Monovalente disponível para a faixa etária. Na ausência pode ser utilizada Pfizer Bivalente	D1	4 semanas após D1	ESQUEMA ENCERRADO
	D2		

Fonte: DPNI/SVSA/MS

